



----- RISKFAKTORER -----

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 9= okänt

**Stroke tidigare**

**TIA/ Amaurosis fugax tidigare?**

(Gäller ej **G45.4** transitorisk global amnesi)

**Förmaksflimmer, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt**

(Gäller även intermittent flimmer eller fladder)

**Rökning** (≥en cigarett/dag, eller slutat under de senaste 3 mån)

----- ABCD2 score -----

ABCD2 score är endast ett prognostiskt score och har ingen annan funktion. Fyll i svarsalternativets siffra!

**Ålder**

1= ≥60 år

0= <60 år

**Blodtryck**

1= ≥ 140/90 vid undersökningen

0= <140/90 vid undersökningen

**Klinisk bild under aktuell TIA**

(TIA kan yttra sig med många olika symtom. ABCD2-score efterfrågar enbart två symtomgrupper)

1= talsvärigheter utan svaghet

2= svaghet i ena sidan (unilateral) kan vara i kombination med andra symtom

0= övriga symtom

**Symtomens varaktighet**

1= symtom varat 10-59 minuter

2= symtom varat ≥ 60 minuter

0= symtom varat < 10 minuter

**Diabetes**

1= diabetes, tidigare diagnosticerad eller nyupptäckt

0= ingen diabetes

----- AKUTVÅRD/DIAGNOSTIK -----

**Datortomografi hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)**

1= ja 2= nej 9= okänt

**MR hjärna under akutskedet (inom 7 dagar efter insjuknandet)**

1= ja 2= nej 9= okänt

**Om ja, MR hjärna under akutskedet:**

1= visar färsk hjärninfarkt 2= visar ingen färsk hjärninfarkt 9= osäkert eller okänt undersökningsfynd

### **Ultraljud halskärl genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

### **CT- angio genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

### **MR-angio genomförd**

= ja, inom 7 dagar efter eller inom en månad före insjuknandet

= ja, senare än 7 dagar

= nej

= okänt

### **Undersökt kärlområde med CT- eller MR-angiografi**

= halskärnen

= intrakraniella kärl

= både halskärl och intrakraniella kärl

= okänt

### **Långtids-EKG (telemetri, Holter eller motsvarande) genomförd**

= ja, under vårdtiden

= beställt till efter utskrivningen

= nej

= okänt

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

se även **FASS** och **läkemedelslista** i Riks-Stroke VÄGLEDNING 3.0

**Svarsalternativ** 1= ja 2= nej 3= nej, planerad insättning vid ÅB inom 2 v efter utskrivning 9= okänt

	Vid insjuknandet	Vid utskrivningen*
<b>Blodtryckssänkande läkemedel</b> (avser samtliga grupper)	_	_
<b>Statiner</b> (t ex Crestor, Lipitor, Pravastatin, Simvastatin, Zocord)	_	_
<b>ASA</b> (t ex Trombyl)	_	_
<b>Clopidogrel</b> (Plavix)	_	_
<b>ASA + dipyridamol</b> (Asasantin)	_	_
<b>Dipyridamol</b> (Persantin)	_	_
<b>Warfarin</b> (Waran)	_	_
<b>Andra perorala antikoagulantia än Warfarin</b> (t ex Pradaxa, Xarelto och andra nya perorala antikoagulantia)	_	_
<b>Huvudorsak varför warfarin eller andra perorala antikoagulantia än Warfarin ej är insatt vid utskrivning vid förmaksflimmer och diagnos G 45</b>		_

1= planerad insättning efter utskrivning 2= kontraindicerat (enl. FASS)

3= interaktioner med andra läkemedel/naturläkemedel (enl. FASS) 4= försiktighet (enl. FASS)

5= falltendens 6= demens 7= patienten avstår behandling 8= annan anledning 9= okänt

----- INFORMATION och UPPFÖLJNING -----

**Information om rökstopp till de som är rökare vid insjuknandet** |\_|  
1= ja 2= nej 3= ej relevant p g a patientens tillstånd 9= okänt

**Information given om bilkörning** |\_|  
1= ja 2= nej 3= ej relevant/saknar körkort 9= okänt

**Är ett återbesök planerat på grund av det aktuella TIA-insjuknandet? (flera svarsalternativ möjliga)**

|\_| = ja, på sjukhus, på särskild strokemottagning

|\_| = ja, på annan sjukhusmottagning

|\_| = ja, på vårdcentral/motsvarande

|\_| = ja, på särskilt boende

|\_| = nej

|\_| = okänt